

## 主観的包括評価

1. BMI (体重kg/身長\*身長m)

21<    19-21    <19

2. 過去3ヶ月間の体重変化

変わらない    1~3kgの減少    3kg以上の減少    わからない

3. 食物摂取の変化

変化なし    減少 期間  週間

タイプ  普通食 (  ごはん  おかゆ )    水分のみ    食べられない

その他     注入

4. 消化器症状(2週間以上持続)

なし    悪心    下痢    嘔吐    食欲不振    その他

5. 活動性

日常生活可能    室内歩行可能    車椅子/寝たきり

6. 褥創

なし    あり

7. 下腿浮腫

なし    あり

8. 嚥下障害

なし    あり    わからない

主観的包括評価

栄養状態良好    中等度の栄養不良    高度の栄養不良

目標

栄養状態の維持    適正な栄養摂取    治療食の知識習得    減塩

減量    血糖改善    低栄養の改善    脱水改善    貧血の改善

褥瘡の改善    経口摂取(嚥下訓練)    経腸栄養    胃瘻の造設

その他

他職種介入に関する事項

入院時食事指導の必要性  なし    あり

栄養食事相談の必要性  なし    あり

退院時の指導の必要性  なし    あり

ST介入の必要性  なし    あり

薬剤管理指導の必要  なし    あり

その他

「NST介入基準」

- \*入院後に絶食(3日以上)、経腸栄養、中心静脈栄養となった患者
- \*経口摂取不良、嚥下障害、褥瘡が出現した患者
- \*PEG予定患者、抗癌剤投与患者
- \*その他気になる患者